


Фентавера

фентанил

 acino

ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



БЕРЕЖНОЕ И НАДЕЖНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ НА 72 ЧАСА!

- Удобство, простота и безопасность применения
- Не нужно делать инъекции или принимать таблетки
- Контролируемое высвобождение лекарственного вещества
- Минимальное влияние на психомоторную и когнитивную функции

Инструкция по медицинскому применению препарата Фентавера

Фентавера

фентанил



Торговое наименование

Фентавера

Международное непатентованное название

Фентанил

Показания к применению

Долгосрочное купирование сильной хронической боли, которую можно контролировать надлежащим образом только при помощи опиоидных анальгетиков.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ.

Режим дозирования

Дозу препарата Фентавера необходимо подбирать индивидуально для пациента и регулярно оценивать после аппликации трансдермальной терапевтической системы. Следует использовать самую низкую эффективную дозу.

Подбор начальной дозы

При подборе дозы Фентавера необходимо учитывать текущее применение опиоидного анальгетика пациентом. Препарат Фентавера рекомендуется использовать у пациентов, которые ранее принимали опиоиды. Другими факторами, которые следует принять во внимание, являются текущее общее состояние здоровья пациента, включая массу, рост, возраст и степень истощения, а также степень опиоидной толерантности.

Основные побочные действия

Гиперчувствительность, анорексия, бессонница, депрессия, тревожность, спутанность сознания, галлюцинации, возбуждение, дезориентация, эйфория, сонливость, головокружение, головная боль, тремор, парестезия, вертиго, учащенное сердцебиение, тахикардия, гипертензия, одышка, угнетение функции дыхания, тошнота, рвота, запор, диарея, сухость во рту, боль в желудке, боль в верхних отделах ЖКТ, диспепсия

Особые указания

Дети: Фентавера следует применять только у детей с опиоидной толерантностью в возрасте от 2 лет. Фентавера не следует применять у детей в возрасте до 2 лет.

Беременность: данные относительно использования системы у беременных женщин ограничены. Исследования на животных показали некоторую репродуктивную токсичность. Потенциальный риск для людей неизвестен.

Кормление грудью: фентанил экскретируется в грудное молоко и может вызвать седацию и/или угнетение дыхания у ребенка, который находится на грудном вскармливании. Поэтому при применении Фентавера не следует кормить ребенка грудью в течение, по меньшей мере, 72 часов после удаления системы.

Лекарственные взаимодействия Одновременное применение других препаратов, угнетающих ЦНС (включая опиоиды, седативные и снотворные средства, средства для общей анестезии, фенотиазины, транквилизаторы, антигистаминные препараты, которые обладают седативным эффектом, и алкогольные напитки) и миорелаксантов может усиливать угнетающие ЦНС эффекты, что может привести к гиповентиляции, снижению артериального давления, чрезмерной седации, коме или летальному исходу. Поэтому сопутствующее применение любого из вышеуказанных препаратов и трансдермальной терапевтической системы Фентавера требует осторожности и особого наблюдения за пациентом.

Дата истечения срока годности с указанием запрета:

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Регистрационные удостоверения: РК-ЛС-5№024032, РК-ЛС-5№024033, РК-ЛС-5№024034 от 25.02.2019, действительны до 25.02.2024

Производитель: «Luye Pharma AG», Ам Виндфельд 35, 83714, Мисбах, Германия, Тел.: +49 (0)8025 2867-0
e-mail: info@luyepharma.eu

Держатель регистрационного удостоверения: «Acino AG», Ам Виндфельд 35, 83714, Мисбах, Германия
Тел.: +49 (0)8025 99460-10, e-mail: qa.miesbach@acino.swiss

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства
ТОО «Ацино Каз», Казахстан, 050047, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 223, н.п. 243, телефон: 8 (727) 364-56-61, e-mail: PV-KAZ@acino.swiss

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ.

KZ-FENT-PIM-062022-028